

## Tiefe Venenthrombose (TVT) oder Lungenembolie (LE)

Sollten bei Ihnen Anzeichen auf eine TVT oder LE hindeuten, wie zum Beispiel schmerzhafte geschwollene Beine oder Schmerzen in der Brust, informieren Sie umgehend Ihren Arzt.



Diese Patientenkarte und alle anderen behördlich genehmigten Schulungsmaterialien sowie die Produktinformationen sind zum Download auf folgender Webseite verfügbar: <https://arzneimittelsuche.abbvie.de>

Ihr Name: \_\_\_\_\_

Name des Arztes, der RINVOQ (Upadacitinib) verschrieben hat:

\_\_\_\_\_

Telefonnummer des Arztes: \_\_\_\_\_

JAKa-DE-00242-FM

## Patientenkarte zur sicheren Anwendung

Bitte beachten Sie auch die Gebrauchsinformation zu RINVOQ®

**Bitte tragen Sie diese Patientenkarte stets bei sich**



Zeigen Sie diese Karte jedem Arzt und anderen Fachkräften im Gesundheitswesen, die an Ihrer medizinischen Versorgung beteiligt sind, z. B. andere Ärzte als der Upadacitinib verordnende Arzt oder Mitarbeiter in der Notaufnahme.

Diese Patientenkarte enthält wichtige Informationen, über die Sie vor, während und nach der Behandlung mit RINVOQ (Upadacitinib) Bescheid wissen sollten.

Version 2.0 (Datum der Genehmigung: August 2021) <http://www.bfarm.de/schulungsmaterial/>

1

## Infektionen

---

Die Behandlung mit Upadacitinib kann zu einer Verschlimmerung einer bestehenden Infektion führen oder die Wahrscheinlichkeit für eine Infektion erhöhen.

Informieren Sie Ihren Arzt umgehend, wenn Sie Anzeichen einer Infektion bemerken, wie z. B.:

- Fieber, nächtliches Schwitzen, Schüttelfrost, Gewichtsverlust, anhaltender Husten, Erschöpfung, Kurzatmigkeit oder schmerzhafter Hautausschlag mit Bläschenbildung.

## Impfungen – zum Schutz gegen Infektionen

---

Während sowie unmittelbar vor einer Behandlung mit Upadacitinib dürfen keine Impfungen mit einer bestimmten Art von Impfstoffen, sogenannten **Lebendimpfstoffen** (z. B. nasal verabreichte Grippe-schutzimpfung, Varizellen-, Masern-Mumps-Röteln-Impfung) durchgeführt werden. Sprechen Sie Ihren Arzt vor einer Impfung darauf an – er weiß, welche Impfstoffe vor oder während der Behandlung mit Upadacitinib **nicht** gegeben werden dürfen.

## Blutfettwerte

---

Ihr Arzt wird während der Behandlung mit Upadacitinib regelmäßig Ihre Blutfettwerte überprüfen, z. B. Ihren Cholesterinwert. So kann entschieden werden, ob Sie zusätzlich Arzneimittel zur Senkung Ihrer Blutfettwerte anwenden sollten.

## Schwangerschaft und Verhütung

---

- Nehmen Sie Upadacitinib nicht ein, wenn Sie schwanger sind oder vermuten, schwanger zu sein.
- Nutzen Sie während der Behandlung mit Upadacitinib sowie für 4 Wochen nach der letzten Anwendung eine zuverlässige Verhütungsmethode. Besprechen Sie mit Ihrem Arzt, welche Verhütungsmethode als zuverlässig infrage kommt.
- Informieren Sie Ihren Arzt umgehend, wenn Sie während der Behandlung schwanger werden.